

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Infancy (6 months)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Look for white spots or decay on teeth. Check for history of decay in family. Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999--00.(21)5.

Hearing Screen

Use clinical judgment.

Lead Screen

Screen infants for these risk factors:

- Live in or frequently visit day care center, preschool, baby sitter's home or other structure built before 1950 that is dilapidated or being renovated.
- Come in contact with other children with known lead toxicity (i.e., blood lead 15ug/dl).
- Live near a lead processing plant or with parents or household members who work in a lead-related occupation (e.g., battery recycling plant).

Developmental Milestones

Always ask about and follow-up on parent concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, the ELMS2 (a language screen), or the MacArthur Communication Development Inventory.

Yes	No		Yes	No	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>No head lag when pulled to sit.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Turns toward voice.</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Bears some weight on legs when held.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transfer object from hand to hand.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Rolls over.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cuddles.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Imitates speech sounds.	Avoids eye contact.		

Instructions for developmental milestones: At least 90% of infants should achieve the underlined milestones by this age. If you have checked "no" on any two items, or even one of the underlined items, or the boxed item, refer the infant for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. **Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies (1-800-322-2588) with questions or concerns on childhood development.**

La salud de su bebé a los 6 meses

Indicadores de logros

Formas de desarrollo de su bebé entre los 6 y 9 meses de edad.

Hace sonidos como "ba-ba-ba" y "dada".

Sujeta pequeñas cosas en su puño, luego entre sus dedos.

Lleva cosas a la boca, puede alimentarse solo con pequeños pedazos de comida blanda.

Se sienta bien.

Se para con apoyo.

Se mueve por el piso sobre su barriga, comienza a gatear.

Podría comenzar a actuar tímido frente a extraños.

Ayuda a su bebé a aprender nuevas aptitudes al jugar con él/ella.

Para ayuda o más información

Seguridad de juguetes y productos para el bebé: Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor, 1-800-638-2772 (voz) o 1-800-638-8270 (TTY Servicio de Retransmisión)

Aprenda resucitación cardiopulmonar (CPR) para infantes y niños y primeros auxilios: Pregunte sobre las clases en su estación de bomberos local, sedes de la Cruz Roja Americana o Asociación Heart o al departamento de salud.

Vacunaciones para la salud y el desarrollo del niño: Línea de Derivación e Información para Healthy Mothers, Healthy Babies (Madres Sanas, Bebés Sanos), 1-800-322-2588 (voz) o 1-800-833-6388 (TTY Servicio de Retransmisión)

Habilidades o apoyo para la crianza: Línea de ayuda familiar, 1-800-932-HOPE (4673) Recursos para familias del noroeste, 1-888-746-9568 Clases en el Colegio Comunitario local

Consejos de salud

Su bebé necesita varias dosis de la mayoría de las vacunas para estar completamente inmunizado. Si le ha faltado alguna dosis de vacunación a su bebé, haga una cita para ponerse al día.

Muestre a su bebé libros con dibujos de colores y háblele sobre estos dibujos. Cántele canciones simples y diga versos infantiles que riman una y otra vez.

Señales que indican que su bebé está listo para comenzar a comer alimentos sólidos:

- Se sienta con poca o sin ayuda.
- Demuestra que quiere probar la comida que usted está comiendo.
- Puede usar la lengua para empujar la comida hacia la garganta.

Su bebé demostrará que comió suficiente. Deje de alimentarlo cuando arroja la comida fuera de su boca, cierra la boca o gira la cabeza. Deje que él controle cuánto come.

Deje que su bebé aprenda a beber de una taza. Coloque agua, leche materna o fórmula en ella. No deje que su bebé lleve el biberón cuando se va la cama.

Consejos sobre Paternidad/Maternidad responsable

Dé a su bebé bastante tiempo para jugar sobre el piso mientras yace en el estómago. Coloque los juguetes apenas fuera de su alcance para que trate de gatear.

Comience a jugar con él a juegos simples como "Peek-a-Boo" (a la escondida) y "Pat-a-Cake" (amasar).

Consejos de seguridad

Asegúrese de que su hogar sea seguro para su bebé antes de que éste empiece a gatear. Tendrá que seguir haciendo esto durante varios años.

- Guarde objetos pequeños y cosas que se puedan romper.
- Pegue los cables eléctricos a la pared, coloque tapas en los toma corrientes.
- Coloque puertas de seguridad al principio y final de la escalera.
- Guarde los venenos y pastillas bajo llave.

Los andadores causan más lesiones que cualquier otro producto para bebés. En lugar de un andador, use un asiento sin ruedas o coloque a su bebé boca abajo en el piso.